NOTAS SOBRE *CASTNIIDAE* ARGENTINOS Y PUBLICACION DE UNA NUEVA SUBESPECIE

(Lepidopt.)

por

ALBERTO BREYER

Castnia icarus invaria Wlkr.

Jörgensen (Rev. Soc. Ent. Arg. III, pág. 176) la cita de varias localidades del Paraguay. Podemos confirmar su presencia en la República Argentina, pues el R. P. Albino J. Bridarolli (S. J.) ha capturado una pareja de esta ssp. en Pindapoy (Misiones).

Castnia icarus **patquiensis** ssp.n:

Aspecto general como *C. icarus endelechia* Druce, diferenciándose por el color más ceniza del tórax y abdomen.

La diferencia principal consiste en la disolución de la cadena de ocelos marginales del ala posterior (faz superior), producida por la desaparición de los rayos negros laterales de cada ocelo; en su lugar queda solamente la circunvalación roja.

Este color rojo es más anaranjado y más ampliado, en especial en el primer ocelo superior, y cubre también todas las manchas triangulares prebordales.

Como parangón con la *C. uruguayana* Burm., que tiene una ssp. en la zona alta y seca de Córdoba, la *C. uruguayana champaquiensis* Breyer, la nueva ssp. *patquiensis* sería también una adaptación de altas montañas, que en ambos casos tiene su expresión en un cambio de dibujo y de colores.

Debemos el ejemplar tipo a la gentileza del señor O. Chiesa Molinari, procedente de Quebrada de la Flecha, a 66 km. al SO. de la ciudad de San Juan (provincia de San Juan, República Argentina), pero como hace años ya habíamos encontrado un ejemplar

igual, pero muy dañado cerca de Patquia (La Rioja, República Argentina), dedicamos esta ssp. a esta última localidad, donde ya tanto material interesante para la ciencia se ha encontrado.

Holotipo en nuestra colección.

Algunas correcciones en trabajos anteriores:

En el trabajo de Jörgensen publicado en la Rev. Soc. Ent. Argentina, tomo 3, pág. 178, este autor amplia la descripción de la *Castnia inornata* Wlkr., pero dice: "el ala posterior es colorado ladrillo".

Observamos que esto correspondería a un ejemplar hembra, mientras que el macho tiene las alas posteriores del mismo color que las alas anteriores. También los demás datos que da al respecto, corresponden a un ejemplar hembra.

En nuestro trabajo publicado en la misma Revista, igual tomo, página 233, se han producido varios errores de imprenta, que deseamos corregir:

En la lámina VIII: la figura N.° 10 corresponde a *C. juturna vesta* Krüger.

En la pág. 237 al lado de *C. juturna vesta* Krüger debe colocarse "Fig. 10".

En la misma página figura como N.° 10 *C. icarus endelechia* Druce. Este N.° 10 debe cambiarse en N.° 9 y cambiarse también el nombre por *C. linus micha* Druce.

En la pág. 238 corresponde borrar "fig. 10".

En la pág. 237 en vez de *fonscolombei,* debe leerse *fonscolombe.*

Actual catálogo de "Castniidae" Argentinos.

C. marcelserres Godk: un macho de Misiones en n. colección, una hembra de Puerto Rico (Misiones) en col. Williner.

C. marcelserres inornata Wlkr: Dado que la procedencia de nuestros ejemplares, según manifestaciones del finado entomólogo doctor Eugenio Giacomelli era dudosa, debemos por lo pronto excluir esta ssp. como argentina, aunque probablemente se encuentre en el futuro en Misiones, desde el momento que Jörgensen manifiesta haberla coleccionado en el Paraguay.

Castnia trais Drury: Misiones en n. col.

,, *phalaris sora* Druce: Misiones en n. col.

Castnia uruguayana Burm.: Si bien se dice que se ha observado en Concordia (Entre Ríos), aun no se ha comprobado definitivamente.

,, *uruguayana champaquiensis* Breyer: de Córdoba en n. col.

,, *Le Cerfi* dalla Torre: de Santiago del Estero y La Rioja en n. col.

,, *archon* Burm.: De Concordia, Santa Fe, Capilla del Monte en n. col. de Catamarca en el Museo Argentino de C. Naturales.

,, *fonscolombe* Godt: de Misiones en n. col.

,, *juturna vesta* Krüger: de Misiones en n. col.

,, *icarus endelechia* Druce: de Formosa en n. col. Chaco, según Jörgensen.

,, *icarus patquiensis* Breyer: La Rioja y San Juan en n. col.

,, ,, *invaria* Wlkr: un macho y una hembra de Pindapoy,

,, Misiones, en n. col., P. Williner *leg.*

,, *linus micha* Druce: Misiones, en n. col.

,, *jörgenseni* Breyer: del Chaco, en n. col.

,, *garbei* Foltterle: de Misiones, en n. col.

,, *argus* Boisdv.: de Misiones, en n. col. y de Puerto Rico (Misiones) en col. Bridarolli.

,, *satrapes catharina* Preiss: de Misiones, en n. col.